

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

**製品名：コタロー温清飲エキス細粒**

主成分：温清飲(Unseiin)  
 剤形：黄褐色～黄緑褐色の細粒剤  
 シート記載など：N57



**この薬の作用と効果について**

- ・皮膚の色つやが悪く、のぼせるなどの症状があるものに用いる漢方薬です。
- ・通常、月経不順、月経困難、血の道症、更年期障害、神経症などの治療に用いられます。

**次のような方は注意が必要な場合があります。必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。**

- ・以前に薬や食べ物で、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。
- ・妊娠または授乳中
- ・他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。

**用法・用量（この薬の使い方）**

・あなたの用法・用量は（：医療担当者記入）

- ・通常、成人は1日12g（温清飲水製乾燥エキスとして6.8g）を1日2～3回に分けて、食前または食間に服用しますが、年齢・体重・症状により適宜増減されます。必ず指示された服用方法に従ってください。
- ・飲み忘れた場合は、気がついたとき、できるだけ早く1回分を飲んでください。ただし、次の飲む時間が近い場合は1回飛ばして、次の通常の飲む時間に1回分を飲んでください。絶対に2回分を一度に飲んではいけません。
- ・誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。
- ・医師の指示なしに、自分の判断で飲むのを止めないでください。

**生活上の注意**

**この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）**

主な副作用として、発疹、発赤、食欲不振、胃部不快感、悪心、嘔吐、下痢などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[ ]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

- ・発熱、から咳、息切れ、呼吸困難[間質性肺炎]
- ・体がだるい、皮膚や白目が黄色くなる[肝機能障害、黄疸]
- ・腹痛・便秘・下痢・腹部膨満などを繰り返す[腸間膜静脈硬化症]

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

**保管方法その他**

- ・乳児、小児の手の届かないところで、直射日光、高温、湿気を避けて保管してください。
- ・薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。

**医療担当者記入欄**                      年    月    日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療関係者向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。