

第2類医薬品

漢方製剤



中国の民間説話「白蛇伝」に登場する女性を伝統的な漢方のイメージとしてシンボルマークとしたものです。

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。  
また必要な時に読めるように大切に保管してください。

りゅう たん しゃ かん とう  
**竜胆瀉肝湯**

エキス細粒G「コタロー」

商品番号

D142

本剤は、尿道や膀胱、外陰部などに炎症（充血、痛み、腫れ）のある場合に用いられます。漢方ではこの炎症を下焦の湿熱とっています。尿が濁ったり、排尿時に痛む、あるいは出しづる、その場合しばしば下腹部が重苦しいといった方、またそういう症状をよく繰り返すとか、ご婦人のおりもの（帯下）にも適しています。

**使用上の注意****してはいけないこと**

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

**次の人は服用しないでください**

生後3カ月未満の乳児。

**相談すること**

**1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください**

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
- (3) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
- (4) 高齢者。
- (5) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (6) 次の症状のある人。  
むくみ
- (7) 次の診断を受けた人。  
高血圧、心臓病、腎臓病

**2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください**

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腸間膜静脈硬化症*	長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる。*

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください  
下痢
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合も服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

## 【効能・効果】

比較的体力があり、下腹部筋肉が緊張する傾向があるものの次の諸症：  
排尿痛、残尿感、尿の濁り、こしけ

## 【用法・用量】

食前または食間に服用してください。  
食間とは……食後2～3時間を指します。

年 齢	1回量	1日服用回数
大人（15歳以上）	1包 または 2.4g	3回
15歳未満7歳以上	2/3包 または 1.6g	
7歳未満4歳以上	1/2包 または 1.2g	
4歳未満2歳以上	1/3包 または 0.8g	
2歳未満	1/4包 または 0.6g	

（大入り剤に添付のサジは、すり切り一杯で約0.6gです）

## 〈用法・用量に関連する注意〉

- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

## 【成分・分量】


成分・分量 本剤3包（7.2g）中		
トウキ……………1.2g	オウバク……………1.2g	ハマボウフウ……1.2g
シャクヤク……………1.2g	サンシシ……………1.2g	シャゼンシ……………1.2g
センキュウ……………1.2g	レンギョウ……………1.2g	カンゾウ……………1.2g
ジオウ……………1.2g	ハッカ……………1.2g	リュウタン……………1.6g
オウレン……………1.2g	モクツウ……………1.2g	タクシャ……………1.6g
オウゴン……………1.2g		

より抽出した水製エキス4.8gを含有しています。

添加物としてステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、乳糖水和物、プルラン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウムを含有しています。

## 【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。  
（誤用の原因になったり品質が変わることがあります）
- 水分が付きますと、品質の劣化をまねきますので、誤って水滴を落したり、ぬれた手で触れないでください。
- 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。  
（分包剤のみ）
- 湿気などにより薬が変質することがありますので、服用後は、ビンのフタをよくしめてください。  
（大入り剤のみ）
- 使用期限を過ぎた商品は服用しないでください。
- ビンの「開封年月日」記入欄に、ビンを開封した日付を記入してください。  
（大入り剤のみ）



湿気注意

本剤は生薬を原料としていますので、商品により多少色が異なることがあります。品質・効果に変わりはありません。

商品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

小太郎漢方製薬株式会社 医薬事業部 お客様相談室  
大阪市北区中津2丁目5番23号 TEL06(6371)9106  
受付時間 9:00～17:30(土、日、祝日を除く)

漢方薬ガイド  
請求券



D142 A30

左のシールをハガキに貼って、お買求めの店名、住所、氏名、年齢、職業、電話番号、症状をお書きください。漢方薬と食薬を詳しく説明した、パンフレットをお送りいたします。

製造販売元 漢方をよりよく より多くの人に



小太郎漢方製薬株式会社

〒531-0071 大阪市北区中津2丁目5番23号  
TEL 06 (6371) 9106

A3021