



中国の民間話話「白蛇伝」  
に登場する女性を伝統的な  
漢方のイメージとしてシン  
ボルマークとしたものです。

第2類医薬品

漢方製剤

## おなかに脂肪が多い方の 肥満症・便秘に

商品番号

T003

### 防風通聖散エキス錠N「コタロー」

本剤は、便秘を改善し、排尿、発汗を促して体内の老廃物を取り去る効果があり  
ます。これらにより体調を整え、脂肪が多い肥満体質を改善する処方です。

防風通聖散エキス錠N「コタロー」は、便秘がちで、特に腹部の皮下脂肪が厚い脂  
肪太りの方に用いられ、また同時に高血圧に伴う症状がある場合にも効果があります。



#### 使用上の注意



#### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください  
他の瀉下薬（下剤）
2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてくだ  
さい



#### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
  - (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
  - (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
  - (5) 発汗傾向の著しい人。
  - (6) 高齢者。
  - (7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
  - (8) 次の症状のある人。  
むくみ、排尿困難
  - (9) 次の診断を受けた人。  
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ち  
に服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談し  
てください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、腹部膨満、 はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛
精神神経系	めまい
その他	発汗、動悸、むくみ、頭痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の  
診療を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れが する・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、こ れらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加 えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、 褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腸間膜静脈硬化症*	長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が 繰り返しあらわれる。*

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続  
または増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬  
剤師または登録販売者に相談してください  
下痢、便秘

4. 1ヵ月位（便秘に服用する場合には1週間位）服用しても症状がよくなり  
ない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に  
相談してください
5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

### 【効能・効果】

体力充実して、腹部に皮下脂肪が多く、便秘がちなもの次の諸症：  
肥満症、高血圧や肥満に伴う動悸・肩こり・のぼせ・むくみ・便秘、蓄膿症（副鼻腔  
炎）、湿疹・皮膚炎、ふきでもの（にきび）

### 【用法・用量】

食前または食間に服用してください。  
食間とは……食後2～3時間を指します。

年 齢	1 回 量	1 日 服 用 回 数
大人（15歳以上）	4錠	3回
15歳未満7歳以上	3錠	
7歳未満5歳以上	2錠	
5歳未満	服用しないでください	

### ＜用法・用量に関連する注意＞

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

### 【成分・分量】



成分・分量（本剤12錠中）		
トウキ……………0.6g	ショウキョウ……………0.15g	ビャクジュツ……………1.0g
シャクヤク……………0.6g	ケイガイ……………0.6g	キキョウ……………1.0g
センキュウ……………0.6g	ポウフウ……………0.6g	オウゴン……………1.0g
サンシシ……………0.6g	マオウ……………0.6g	カンゾウ……………1.0g
レンギョウ……………0.6g	ダイオウ……………0.75g	セッコウ……………1.0g
ハッカ……………0.6g	無水ポウショウ……………0.35g	カッセキ……………1.5g

より抽出した防風通聖散エキス散(1/2量)3.60gを含有しています。

添加物としてカルメロースカルシウム、含水二酸化ケイ素、軽質無水ケイ酸、ステア  
リン酸マグネシウム、トウモロコシデンプンを含有しています。

### 【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4)ぬれた手や湿気を帯びた手で取り扱わないでください。水分は錠  
剤の色や形が変わる原因になります。
- (5)ピンのフタのしめ方が不十分な場合、湿気等の影響で錠剤の品質が  
変わることがありますので、服用のつどフタをよくしめてください。
- (6)ピンの中の詰めものは、フタをあけた後はすててください。  
(詰めものは、輸送中に錠剤が破損することを防ぐためのもので  
すので、再使用されると異物の混入や湿気により品質が変わる原  
因になることがあります)
- (7)使用期限を過ぎた商品は服用しないでください。
- (8)箱とピンの「開封年月日」記入欄に、ピンを開封した日付を記入  
してください。



湿気注意

本剤は生薬を原料としていますので、商品により多少色が異なることが  
ありますが、品質・効果に変わりはありません。

商品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。  
小太郎漢方製薬株式会社 医薬事業部 お客様相談室  
大阪市北区中津2丁目5番23号 TEL06(6371)9106  
受付時間 9:00～17:30(土、日、祝日を除く)

漢方薬ガイド  
請求券



T003 A30

左のシールをハガキに  
貼って、お買求めの店  
名、住所、氏名、年齢、  
職業、電話番号、症状  
をお書きそえのうえ、  
お申込みください。漢  
方薬と食養を詳しく説  
明した、パンフレット  
をお送りいたします。

製造販売元

漢方をよりよく より多くの人に



小太郎漢方製薬株式会社

〒531-0071 大阪市北区中津2丁目5番23号  
TEL 06 (6371) 9106  
http://www.kotaro.co.jp/